



## Produire du fourrage hors sol en saison sèche Recette

Sam Tokoro BACYE, président de l'[APAD Sanguière](#) (voir notre article) et bien connu des agroécologistes, ne développe pas que du maraîchage bio, il a tout un volet élevage bio. Il nous donne sa recette.

### Recette du fourrage frais hors sol

Pour volaille – lapins – moutons - ânes

En 6 jours c'est prêt pour les animaux :

Avec **1kg de graines de maïs jaune** du Burkina, on obtient **8kg de fourrage** super riche en nutriments." SURTOUT NE PAS FAIRE AVEC GRAINES DE SORGHO (La jeune pousse de sorgho est poison).

#### Préparation des graines de maïs :

- Faire tremper toute une nuit les grains de maïs dans de l'eau tiède avec 2 cuillerées de sel ;
- Enlever les graines, les mettre dans un seau pour les laver à l'eau normal ;
- Puis les mettre dans un sac pour les égoutter.

#### Préparation du support :

- Percer 2 trous au fond ;
- Déposer un lit de feuille au fond et la paille par-dessus.

#### Mise en place des graines :

- Déposer les graines de maïs sur le paillis ;
- Arroser le lendemain matin puis chaque matin.

#### Résultat

Au bout de 2 ou 3 jours on voit les graines germer.

Au bout d'1 semaine on peut donner aux animaux.

**(Il ne faut pas laisser grandir plus de 20 cm, après c'est pas bon).**

-----  
Sam nous dit encore :

**Les moutons** aiment les feuilles de **moringa**, de **pois d'angole** les feuilles de **Senna** et de **leucéna**, de **papaye fraîches ou sèches**, feuilles de **niébé** et les **tiges de mil**.

**Les chèvres** les feuilles de **moringa**, de **Senna** et de **leucéna** . Elles n'aiment pas trop les feuilles de pois d'angole (elles les mangent quand il n'y a rien d'autre) et pas du tout les feuilles de papaye.

**Le soir** leur donner **du son de maïs et de mil** mélangé avec du **drèche de dolo**.

ATTENTION **ce n'est pas bon du tout au soleil**. Si ça reste il faut le récupérer. Si c'est gardé à l'ombre on peut le redonner le soir.

-----  
Autre conseil

**Des gousses de Piliostigma reticulatum pilées** « Baganda » en mooré  
Alimentation pour porcs, moutons, chèvres, volaille et boeufs.

Faire sécher les gousses au soleil puis les concasser dans des mortiers en même temps que les graines.

On obtient ainsi de la **farine de gousse**. Période de récolte : de décembre à avril.

Pour obtenir 1 kg de farine de gousses, il a fallu concasser 8 kg de gousses sèches.

**Pour l'embouche des moutons**, on le donne avec **de feuilles de Cajanus Cajan (Pois d'Angole)** et **des tourteaux de coton**.

-----  
Tiré de l'article sur **Burkinadoc de Mil'Ecole** : [Pour améliorer l'alimentation du bétail en brousse](#)