Tableau de rotation culturale dans les 4 champs d'essais

Pratiquée et préconisée par
la ferme pilote TENKEEGA de Goéma

<table>
<tr><td>N-1 (2023)</td><td>Culture principale :
Jachère spontanée</td><td>N-1 (2023)</td><td>Culture principale : Sorgho (sorgho local, pelgo et sorgho rouge)</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>Culture principale : Sorgho (sorgho local)</td><td>2024</td><td>Légumineuses (arachide, sésame, bissap et niébé)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Techniques de culture utilisée pour le sorgho
Creusage des trous de zaï en avril suite au passage du kirpy
Dépôt et recouvrement du compost du 06 au 10 mai
Semis le 3 juin et ressemis le 24 juin
Sarclage localisé du 15 au 17 juillet
Repiquage et démariage le 7 aout
Second sarclage sur toute la surface du 27 au 29 août
Date de récolte : du 23 au 25 octobre</td><td colspan="2">Techniques de culture utilisées les légumineuses :
Nettoyage du champ
Semis du 03 au 06 juillet suite au passage du kirpy
Premier sarclage du 28 au 31 juillet
Second sarclage du 23 au 25 aout
Date de récolte : du 16 septembre au 30 octobre</td></tr>
<tr><td>N-1 (2023)</td><td>Culture principale :
Mil (mil local et une variété de mil venant du Niger)</td><td>N-1 (2023)</td><td>Légumineuses (arachide, mung bean, sésame, fonio, bissap et niébé)</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>Culture principale :
Jachère spontanée</td><td>2024</td><td>Culture principale : Mil (variété de mil à long épis venant du Niger)</td></tr>
<tr><td colspan="2">technique de culture utilisées pour la jachère :
Laisser la nature s'exprimer par un enherbement spontané
Pâturage rationnel avec plusieurs passages de bœufs appartenant aux éleveurs peuhls et mossis</td><td colspan="2">Technique de culture utilisée pour le mil :
Préparation du champ
Semis du mil le 24 juin
Sarclage localisé du 11 au 12 juillet
Repiquage le 08 août
Second sarclage fin août
Date de récolte : du 24 au 25 octobre</td></tr>
</table>

TERRE VERTE

https://eauterreverdure.org/